



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 31270.18—2014

## 化学农药环境安全评价试验准则 第 18 部分: 天敌两栖类急性毒性试验

Test guidelines on environmental safety assessment for chemical pesticides—  
Part 18: Amphibian acute toxicity test

2014-10-10 发布

2015-03-11 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

GB/T 31270《化学农药环境安全评价试验准则》分为 21 个部分：

- 第 1 部分：土壤降解试验；
- 第 2 部分：水解试验；
- 第 3 部分：光解试验；
- 第 4 部分：土壤吸附/解吸试验；
- 第 5 部分：土壤淋溶试验；
- 第 6 部分：挥发性试验；
- 第 7 部分：生物富集试验；
- 第 8 部分：水-沉积物系统降解试验；
- 第 9 部分：鸟类急性毒性试验；
- 第 10 部分：蜜蜂急性毒性试验；
- 第 11 部分：家蚕急性毒性试验；
- 第 12 部分：鱼类急性毒性试验；
- 第 13 部分：溞类急性活动抑制试验；
- 第 14 部分：藻类生长抑制试验；
- 第 15 部分：蚯蚓急性毒性试验；
- 第 16 部分：土壤微生物毒性试验；
- 第 17 部分：天敌赤眼蜂急性毒性试验；
- 第 18 部分：天敌两栖类急性毒性试验；
- 第 19 部分：非靶标植物影响试验；
- 第 20 部分：家畜短期饲喂毒性试验；
- 第 21 部分：大型甲壳类生物毒性试验。

本部分是 GB/T 31270 的第 18 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。

本部分负责起草单位：农业部农药检定所、环保部南京环境科学研究所。

本部分主要起草人：周军英、曲甍甍、单正军、田丰、俞瑞鲜、郝身伟、陈朗。

# 化学农药环境安全评价试验准则

## 第 18 部分: 天敌两栖类急性毒性试验

### 1 范围

GB/T 31270 的本部分规定了天敌两栖类急性毒性试验的材料、条件、操作、质量控制、数据处理、试验报告等的基本要求。

本部分适用于为化学农药登记而进行的天敌两栖类急性毒性试验, 其他类型的农药可参照使用。

本部分不适用于易挥发和难溶解的化学农药。

### 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 2.1

##### **半致死浓度 median lethal concentration**

在急性毒性试验中, 引起 50% 的供试生物死亡时的供试物浓度, 用  $LC_{50}$  表示。

注: 单位为 mg a.i./L。

#### 2.2

##### **供试物 test substance**

试验中需要测试的物质。

#### 2.3

##### **化学农药 chemical pesticide**

利用化学物质人工合成的农药。其中有些以天然产品中的活性物质为母体, 进行仿制、结构改造, 创新而成, 为仿生合成农药。

同义词: 有机合成农药 synthetic organic pesticide。

[NY/T 1667.1—2008, 定义 2.3.1]

#### 2.4

##### **原药 technical material**

在制造过程中得到的有效成分及杂质组成的最终产品, 不能含有可见的外来物质和任何添加物, 必要时可加入少量的稳定剂。

[NY/T 1667.2—2008, 定义 2.5.1]

#### 2.5

##### **制剂 formulation product**

由农药原药(或母药)和助剂制成使用状态稳定的产品。

[NY/T 1667.2—2008, 定义 2.4]

#### 2.6

##### **半静态试验法 semi-static test**

试验期间每隔一定时间(如 24 h)更换一次药液, 以保持试验药液的浓度不低于初始浓度的 80%。

2.7

**静态试验法 static test**

试验期间不更换试验药液。

2.8

**流水式试验法 flow-through test**

试验期间药液连续更新。

### 3 试验概述

天敌两栖类急性毒性测定方法有静态法、半静态法与流水式试验法三种。应根据供试物的性质采用适宜的方法。分别配制不同浓度的供试物药液,于 96 h 的试验期间每天观察并记录蝌蚪的中毒症状和死亡数,并求出 24 h、48 h、72 h 和 96 h 的  $LC_{50}$  值及 95% 置信限。

### 4 试验方法

#### 4.1 材料和条件

##### 4.1.1 供试生物

推荐使用泽蛙(*Rana Limnocharis*)或非洲爪蟾(*Xenopus laevis*)蝌蚪。具体龄期和适宜水温见附录 A。如果选用其他两栖类作为试验材料,应该采用能够满足其生理要求的相应驯养和试验条件,并加以说明。

试验用蝌蚪应选用健康无病、龄期一致的蝌蚪。试验前在室内预养 3 d,试验前一天停止喂食,试验中亦不喂食。

##### 4.1.2 供试物

农药制剂、原药或纯品。对难溶于水的农药,可用少量对蝌蚪低毒的有机溶剂助溶,用量不得超过 0.1 mL(g)/L。

##### 4.1.3 主要仪器设备

主要仪器设备如下:

- 溶解氧测定仪;
- 温度计;
- 酸度计;
- 玻璃缸;
- 量筒等。

##### 4.1.4 试验用水

试验用水为经活性炭处理、存放并曝气处理 24 h 以上的自来水或能注明配方的稀释水。水质硬度在 10 mg/L~250 mg/L 之间(以  $\text{CaCO}_3$  计),pH 在 6.0~8.5 之间,溶解氧含量不应低于空气饱和值(ASV)的 60%。

##### 4.1.5 承载量

静态和半静态试验系统最大承载量为 1.0 g(受试生物)/L,流水式试验系统承载量可高一些。

#### 4.1.6 试验条件

光暗比 16 h : 8 h, 或者自然光照。

## 4.2 试验操作

#### 4.2.1 方法的选择

应根据供试物的特性选择静态试验法、半静态试验法或流水式试验法。如使用静态或半静态试验法，应确保试验期间试验药液中供试物浓度不低于初始浓度的 80%。如果在试验期间试验药液中供试物浓度发生超过 20% 的偏离，则应检测试验药液中供试物的实际浓度并以此计算结果，或使用流动试验法进行试验，以稳定试验药液中供试物浓度。

#### 4.2.2 预试验

按正式试验的条件,以较大的间距设置4个~5个浓度组。通过预试验求出蝌蚪最高全存活浓度和最低全致死浓度。

#### 4.2.3 正式试验

在预试验确定的浓度范围内以一定几何级差(不超过 2.2)设置 5 个~7 个浓度组,并设一个空白对照组,使用有机溶剂助溶的增设溶剂对照组,每个浓度设三个重复。每缸放入 10 只蝌蚪,试验开始后 6 h 内随时观察并记录试验用蝌蚪的中毒症状及死亡率,其后于 24 h、48 h、72 h 和 96 h 观察并记录蝌蚪的中毒症状及死亡率,及时清除死蝌蚪。每天测定并记录试液温度、pH 及溶解氧。

#### 4.2.4 限度试验

设置上限浓度 100 mg a.i./L, 即供试物达 100 mg a.i./L 时供试生物死亡率未超过空白对照组, 则无需继续进行试验。若供试物溶解度小于 100 mg a.i./L, 则采用其溶解度上限作为试验浓度。

### 4.3 数据处理

#### 4.3.1 统计分析方法的选择

可采用寇氏法、直线内插法或概率单位图解法计算每一观察时间(24 h、48 h、72 h 和 96 h)的天敌两栖类急性毒性的半致死浓度  $LC_{50}$ ，也可采用数据统计软件进行分析和计算。

#### 4.3.2 寇氏法

用寇氏法可求出天敌两栖类在 24 h、48 h、72 h 和 96 h 的  $LC_{50}$  值及 95% 置信限。

$LC_{50}$  的计算见式(1):

式中：

$X_m$  ——最高浓度的对数；

$i$  ——相邻浓度比值的对数;

$\Sigma P$  ——各组死亡率的总和(以小数表示)。

95%置信限的计算见式(2):

标准误的计算见式(3):

式中：

$p$  ——1个组的死亡率；

$$q = 1 - p;$$

$n$  ——各浓度组两栖类的数量。

### 4.3.3 直线内插法

采用线性刻度坐标，绘制试验物质浓度对死亡百分率的曲线，求出 50% 死亡时的  $LC_{50}$  值。

#### 4.3.4 概率单位图解法

用半对数纸,以浓度对数为横坐标、死亡百分率对应的概率单位为纵坐标绘图。将各实测值在图上用目测法画一条相关直线,从直线中读出致死 50% 的浓度对数,估算出  $LC_{50}$  值。

## 4.4 质量控制

质量控制条件：

——驯养期间死亡率不得超过 5%；

——试验期间对照组死亡率不超过 10%，且无异常行为出现；

——试验期间,试验溶液的溶解氧含量不应低于空气饱和值(ASV)的60%。

## 5 试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

- 供试物的信息,包括供试农药的通用名、化学名称、结构式、CAS 号、纯度、基本理化性质、来源等;
  - 供试生物名称、来源、大小及驯养情况;
  - 试验条件,包括试验温度、光照等,所采用稀释水的温度、溶解氧浓度及 pH 等;
  - 试验药液的浓度及 24 h、48 h、72 h 和 96 h 的  $LC_{50}$  值和 95% 置信限,并给出所采用的计算方法;
  - 对照组蝌蚪是否出现死亡及异常反应;
  - 观察到的毒性效应,如受试蝌蚪的任何不正常的行为、中毒症状等;
  - 对天敌两栖类的毒性等级划分参见附录 B。

**附录 A**  
**(规范性附录)**  
**供试生物龄期及培养水温要求**

试验用蝌蚪的龄期和水温条件参考表 A.1。

表 A.1 试验用蝌蚪的龄期和适宜水温

蛙种	龄期	适宜水温
泽蛙	6 d~10 d (Gosner25 期)	20 ℃~25 ℃
非洲爪蟾	6 d~10 d (NF46~47 期)	21 ℃~23 ℃

**附录 B**  
**(资料性附录)**  
**农药对蝌蚪的急性毒性等级划分**

按农药对蝌蚪半致死浓度  $LC_{50}$  (96 h), 将农药对蝌蚪的急性毒性等级分为四级, 见表 B.1。

**表 B.1 农药对两栖类的毒性等级划分**

毒性等级	$LC_{50}$ (96 h)/(mg a.i./L)
剧毒	$LC_{50} \leqslant 0.1$
高毒	$0.1 < LC_{50} \leqslant 1.0$
中毒	$1.0 < LC_{50} \leqslant 10$
低毒	$LC_{50} > 10$

### 参 考 文 献

- [1] NY/T 1667.1—2008 农药登记管理术语 第1部分:基本术语
  - [2] NY/T 1667.2—2008 农药登记管理术语 第2部分:产品化学
  - [3] OECD(2009). Guideline 231: the Amphibian Metamorphosis Assay, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals.
  - [4] US EPA(1996). Tadpole/Sediment Subchronic Toxicity Test (OPPTS 850.1800). Ecological effects test guidelines.
  - [5] ASTM (2007) . Standard Guide for Conducting Acute Toxicity Tests on Test Materials with Fishes, Macr. oinvertebrates, and Amphibians. American Society for Testing and Materials, ASTM E729-96.
  - [6] OECD(1992). Guideline 203: Fish, Acute Toxicity Test. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals.
  - [7] 蔡道基.农药环境毒理学研究.北京:中国环境科学出版社,1999.
-

中华人民共和国  
国家标准  
化学农药环境安全评价试验准则  
第18部分：天敌两栖类急性毒性试验

GB/T 31270.18—2014

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946


中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字  
2014年10月第一版 2014年10月第一次印刷

\*  
书号: 155066·1-50223 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



GB/T 31270.18-2014